



毒キノコに 要・注意!

食用のキノコと確実に判断
できないキノコは、絶対に「採
らない、食べない、売らない、
人にあげない」ようにしまし
よう!

ツキヨ タケ



食後30分〜1時間程度で嘔
吐、下痢、腹痛を起す。

【間違えやすい植物】

ヒラタケ、ムキタケ、シイタケ

クサウラ ベニダケ




食後20分〜1時間程度で嘔
吐、下痢、腹痛を起す。唾
液の分泌、瞳孔の縮小、発汗
などの症状も。

【間違えやすい植物】

ホンシメジ、ハタケシメジなど

テングタケ



食後30分程度で嘔吐、下痢、
腹痛を起す。瞳孔の縮小、
発汗、めまい、痙攣、呼吸困難
を起すこともある、死亡例も。

ニセクロハツ



食後30分から数時間程度で
嘔吐、下痢などを起す、そ
の後18〜24時間ほどで全身筋
肉痛、呼吸困難を起し、死
亡に至ることがある。

問合せ先 鳥取市保健所 生活安全課 ☎0857-30-8552



皆さんの元へ毎月お届けし
ている「広報ちづ」。こちら
は、インターネットやスマー
トフォンのアプリでも読めま
す。「確認したいことがある
けど手元に広報がない!」と
いう時などに活用ください。

インターネット上で 読みたい人

・智頭町ホームページ

[http://cms.sanin.jp/p/
chizu/kikaku/kouhou/](http://cms.sanin.jp/p/chizu/kikaku/kouhou/)



・マイ広報誌

<https://mykoho.jp/>
サイト内検索から「智頭町」
と検索して閲覧できます。



スマホアプリで 読みたい人

・マチイロ
〜マチを好きになるアプリ〜
<https://machiiro.town/>

スマートフォンのアプリです
が、インターネット上でも閲
覧できます。(最新号から数ヶ
月分のみ)
※「マチイロ」は「智頭町議
会だより」も閲覧できます。



NEW!

「広報ちづ」 をリニューアルします!

より読みやすく、親しみやすい広報
誌となるよう、今号から、紙面のデザ
インや構成を変更しています。

今後も試行錯誤して参りますので、
「広報ちづ」をよろしくお願ひします。

問合せ先 役場企画課 ☎75-4112